

Synthèse régionale des utilisations hors référentiels en 2016

Cétuximab – Erbitux®

Cette synthèse correspond aux données transmises par les établissements d'Ile-de-France dans le cadre du rapport d'étape annuel 2016 du contrat de bon usage.


Ce document est purement descriptif et **ne préjuge ni de la pertinence clinique** de ces utilisations **ni de leur prise en charge financière.**

- 9^{ème} rang des dépenses liste en sus de médicaments en Ile-de-France

→ 18 100 209 € en 2016*

→ 3,2 % des dépenses liste en sus médicaments

Dépenses (euros; dépenses T2A accordée) IDF relatives au Cétuximab - ERBITUX



Utilisations hors AMM : nb patients/médicaments

Médicaments	Nb de patients
Rituximab - MABTHERA IV	1035
Bevacizumab - AVASTIN	1130
Pemetrexed - ALIMTA	793
Bendamustine - LEVACT & génériques	448
Bortezomib - VELCADE	299
Trastuzumab - HERCEPTIN IV	255
Doxorubicine - CAELYX	201
Rituximab - MABTHERA SC	124
Cetuximab - ERBITUX	109
Pertuzumab - PERJETA	103
Panitumumab - VECTIBIX	55
Azacitidine - VIDAZA	48
Brentuximab vedotin - ADCETRIS	45
Doxorubicine - MYOCET	39
Clofarabine - EVOLTRA	26
Eribuline - HALAVEN	23
Trastuzumab - HERCEPTIN SC	21
Cytarabine - DEPOCYTE	19
Arsenic trioxyde - TRISENOX	17
Trabectedine - YONDELIS	17
Temsirolimus - TORISEL	14


37 DCI, 4 905 patients

Dexrazoxane - CYRDANAX	13
Ipilimumab - YERVOY	12
Cladribine - LEUSTATINE	11
Busulfan - BUSILVEX & génériques	7
Cladribine - LITAK	6
Obinutuzumab - GAZYVARO	6
Nélarabine - ATRIANCE	5
Pembrolizumab - KEYTRUDA	5
Aflibercept - ZALTRAP	3
Cabazitaxel - JEVTANA	3
Ibritumomab tiuxetan - ZEVALIN	3
Idarubicine - ZAVEDOS	3
Trastuzumab emtansine - KADCYLA	3
Ofatumumab - ARZERRA	2
Idarubicine - ZAVEDOS	1
Nivolumab - OPDIVO	1

Utilisations hors AMM du Cétuximab – ERBITUX® (1)

- 109 patients concernés par des utilisations hors AMM de Cétuximab.
- Toutes les typologie d'établissements (ES) ont déclaré des utilisations hors AMM.


→ 13 ES privés, 11 ES publics, 3 ESPIC (soit 27 ES ayant déclaré au moins 1 utilisation hors AMM)



- Nombreuses situations cliniques pour lesquelles la (les) justification(s) bibliographique(s) transmise(s) dans le cadre du CBU ne répond(ent) pas aux critères exigés.

→ Aucune justification bibliographique transmise pour 22 patients (20%)

- 3 localisations avec n ≥ 10 patients parmi 12 localisations identifiées :



ORL (n = 43 patients)
Cancer épidermoïde de la tête et du cou

Rechute et/ou métastatique (n=42)

- **Associé à une ou plusieurs chimiothérapie :**
 - au paclitaxel : n=12 (L1, L2 ou ≥L3)
 - aux sels de platine + taxane : n=10 (L1 ou ≥L3)
- **Monothérapie non associée à une radiothérapie : n=20** (L1, L2 ou ≥L3)

Entretien (monothérapie, L1) : n=1

Cutanée¹ (n = 27 patients)

Rechute et/ou métastatique (n=25)

- **L1 en association** à une ou plusieurs chimiothérapies : n=12
- **Associé à la radiothérapie** : n=3 (L1 ou non renseigné pour 2 patients)
- **Monothérapie (L1 ou L2) : n=4**

Néo-adjuvant : n=2

¹ Stade de la maladie et ligne de traitement non renseignés pour 6 patients.

Colon (n = 20 patients)
Cancer colorectal

Métastatique (n=19)

- **L1 non associé au FOLFOX** : n=3
- **≥L2 en association à une chimiothérapie NON à base d'irinotécan** : n=12
- **>L3 en association à irinotécan** : n=2
- **Monothérapie de maintenance** après réponse à une association Erbitux/FOLFOX ou FOLFIRI : n=2

Adjuvant : n=1

Statut K-RAS	
Sauvage	11 patients
Non renseigné	9 patients