

**Après décongélation** (depuis la plateforme nationale ou les établissements « congéloporteurs ») : **à utiliser dans les 5 jours (120 heures)**

Se référer au document de traçabilité et à l'étiquette sur le flacon indiquant l'heure et la date exacte du transfert du congélateur.

### Stockage

Mode opératoire  
(réalisation de manière extemporanée)



- Séance de vaccination en présence d'un médecin dans l'EHPAD.
- Préparation et administration par IDE dédié à cette mission.

Sortie du flacon  
du réfrigérateur

Dilution  
avant emploi

Préparation des doses  
individuelles de 0,3ml  
(en seringue)

Administration :  
**1 dose unique de 0,3ml**  
(IM dans muscle deltoïde de la partie supérieure du bras)




Planification  
2<sup>de</sup> dose  
entre J21 et J42<sup>1</sup>

Réfrigérateur

Réfrigérateur →  
Salle de soins

Salle de soins

Local adapté ou chambre



ANAPHYLAXIE!  
Cf Fiche 4

1 flacon de suspension NON diluée (suspension blanc/blanc cassé)

1 flacon MULTI-DOSES  
(6 doses<sup>3</sup> de 0,3ml) de  
suspension DILUÉE (blanc cassé)

Préparation de 6 DOSES UNITAIRES<sup>3</sup>  
VACCINALES NOMINATIVES  
(suspension DILUÉE blanc cassé)

Cf. [Modalités de STOCKAGE](#) du vaccin Comirnaty®



- En adéquation avec la planification du nombre de patients à vacciner/jour. (1 flacon pour 6 patients<sup>3</sup>)

Cf. [Fiche 3 - PREPARATION et modalités d'INJECTION](#) du vaccin Comirnaty®



Cf. [Recommandations SERINGUES et AIGUILLES](#) vaccination Comirnaty® (EuroPharmat; SFPC)



**Réfrigérateur :**  
suivi et traçabilité des températures a minima 3x/j (matin, après-midi, nuit)  
Privilégier un système automatisé de traçabilité et d'enregistrement des températures.

- Sortir du réfrigérateur un flacon.
- Laisser le flacon revenir à **température ambiante** (jusqu'à +25°C<sup>1</sup>/+30°C<sup>2</sup>).

**Sur étiquette du flacon de vaccin :**  
date et heure de dilution  
[Cf. Planche étiquettes FLACON](#) (à apposer en « drapeau »)

**Sur étiquette de la seringue :**  
nom du vaccin, n° lot, date et heure (h) limite d'utilisation (h+6 après la dilution)  
[Cf. Planche étiquettes SERINGUE](#) (à apposer en « drapeau »)

**Dans « Vaccin COVID » et dossier du patient :**  
nom du vaccin, n° lot, jour et heure de l'administration.



Entre +2°C/+8°



Entre sortie du réfrigérateur et dilution : **max 2h à température ambiante** (≤ +25°C<sup>1</sup>/+30°C<sup>2</sup>)



Dilution, préparation et administration à température ambiante ≤ +25°C<sup>1</sup>/+30°C<sup>2</sup>  
**Après dilution, les flacons sont à utiliser dans les 6 heures**  
et à conserver entre +2°C et ≤+25°C<sup>1</sup>/+30°C<sup>2</sup>  
**Après dilution, PAS DE TRANSPORT**



Conservation à l'abri lumière du soleil et UV.  
Limiter exposition à éclairage intérieur.



Le flacon de vaccin peut être manipulé dans des **conditions d'éclairage intérieur**.