

**RECOMMANDATION**

Dénomination Commune Internationale :  
**HEXYL AMINOLEVULINATE**

Nom commercial :  
**HEXVIX®**

OMEDIT IDF 2018

Version : 7

Création : Janvier 2008  
 Révision : Janvier 2018

**Classe pharmaco thérapeutique : agent diagnostique**  
**Code ATC : V04CX**

**MAJ 01/2018 - Extraits RCP - Source : ANSM [révision du 05/10/2017](#)**

**MODALITÉS DE PRESCRIPTION**

LISTE I - Médicament soumis à prescription médicale

**POSOLOGIE ET MODALITÉS D'ADMINISTRATION**

Population	Posologie/ voie d'administration
<b>Adultes et patients âgés</b>	<p><b>Faire vider la vessie avant instillation</b>  <b>50 ml (concentration 8 mmol/l) à instiller dans la vessie à l'aide d'une sonde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Le patient doit attendre ≈60 min avant de vider sa vessie</li> <li>* L'exploration en lumière bleue est mise en route dans les 60 minutes ≈ suivant l'évacuation de la vessie.</li> <li>* <i>La cystoscopie ne devrait pas être effectuée plus de 3 heures après l'instillation d'Hexvix dans la vessie</i></li> </ul> <p>Avant de débiter tout acte chirurgical, il est recommandé d'examiner et de cartographier toute la vessie en lumière blanche et en lumière bleue, pour une visualisation optimale. Des biopsies de toutes les lésions visualisées doivent normalement être pratiquées en lumière blanche et il est vérifié en lumière bleue que la résection est complète.</p>

**MODALITES DE PREPARATION/INCOMPATIBILITES**

Présentation/ voie d'administration	Solvant de dilution/reconstitution	Concentration finale
<b>HEXVIX®</b> 85 mg/ 50mL instillation intravésicale	50 ml du solvant fourni	<b>8 mmol/l</b>

**Incompatibilités:** NE PAS MELANGER avec d'autres médicaments

**MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Précaution d'emploi	Conduite à tenir
<b>Réactions d'hypersensibilité (réactions anaphylactiques / anaphylactoïdes...)</b>	<b>Mettre à disposition immédiatement les médicaments et l'équipement nécessaires</b>
<b>Accumulation de porphyrines et toxicité locale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*<b>Ne pas utiliser</b> si risque élevé d'inflammation de la vessie, par exemple après traitement par BCG ou dans le cas d'une leucocyturie modérée à sévère.</li> <li>*Une inflammation <b>peut entraîner une accumulation accrue de porphyrines et un risque plus important de</b></li> </ul>

**RECOMMANDATION**

Dénomination Commune Internationale :  
**HEXYL AMINOLEVULINATE**

Nom commercial :  
**HEXVIX®**

OMEDIT IDF 2018

Version : 7

Création : Janvier 2008  
 Révision : Janvier 2018

	<p><b>toxicité locale</b> après illumination ainsi qu'une fausse image de fluorescence.  <i>Une inflammation diffuse de la vessie devra être exclue par cystoscopie avant administration du produit.</i></p>
--	--

**GROSSESSE ALLAITEMENT**

	<b>Conduite à tenir</b>	<b>Niveau de preuve</b>
Grossesse	<b>Administration déconseillée</b>	<i>Chez l'animal</i> : pas d'effets délétères directs ou indirects sur la reproduction  <i>Chez l'homme</i> absence de données
Allaitement	<b>Interrompre l'allaitement pendant le traitement</b>	<i>Chez l'homme et l'animal</i> : absence de données
Fertilité	<i>Chez l'animal</i> : <b>Males</b> : absence de données <b>Femelles</b> : pas d'effets sur la fertilité  <i>Chez l'homme</i> : absence de données	