

CONTEXTE

A l'heure où des objectifs ambitieux destinés à promouvoir la prescription des biosimilaires à l'hôpital sont fixés, des freins subsistent. Les stratégies intra-hospitalière de référencement et d'utilisation des biosimilaires sont des leviers sur lesquels agir, auxquelles la problématique des prescriptions hospitalières exécutées en ville doit être intégrée.



MATERIELS & METHODES

Indicateur Contrat de Bon Usage (CBU) 2016 :
Taux de dispensation de biosimilaires aux unités de soins

Nb d'établissements concernés par le CBU 2016 en Ile-de-France : **N = 203**

1 Stratégies de référencement

$$R = \frac{\text{nb d'UCD de biosimilaires délivrées}}{\text{nb d'UCD de médicaments biologiques (référence + biosimilaires) délivrées}}$$




Résultats exprimés en % d'établissements répartis selon les 4 stratégies de référencement

OBJECTIFS

Réaliser un bilan régional des stratégies de référencement à l'hôpital des biosimilaires et identifier les facteurs susceptibles d'influencer leur pénétration.

RESULTATS



Recours majoritaire au(x) biosimilaire(s)

Multi-référencement (biologique de référence et biosimilaire) avec recours majoritaire au biologique de référence

Recours majoritaire au biologique de référence

G-CSF

- Financement : intra-GHS
- Prescripteurs : onco/hématologue
- Séjour préférentiel : ambulatoire

Infliximab

- Financement : hors-GHS
- Séjour préférentiel : hôpital de jour
- Pathologies chroniques
- Profil des prescripteurs : multiples, majoritairement rhumatologie et hépatogastroentérologie


EPO

- Financement : hors-GHS puis intra-GHS
- Séjour préférentiel : ambulatoire
- Profil de prescripteurs plus large


GHS : Groupe homogène de séjour

2 Identification des facteurs d'influence

3 sources d'informations



Facteurs d'influence ?



CONCLUSION

Ce bilan met en exergue la variabilité des stratégies de référencement selon la molécule concernée tant en inter qu'en intra-établissement(s) et illustre toute la complexité de la pénétration des biosimilaires à l'hôpital. C'est pourquoi, il semble indispensable de compléter toute approche globale sur les biosimilaires par des approches ciblées, prenant en compte les facteurs d'influence identifiés.