

INDICATION AMM

- Traitement intrathécal de la méningite lymphomateuse
Chez la plupart des patients, un tel traitement fera partie des soins palliatifs de la maladie.

AMM européenne ■ 11/07/2001
Avis de la transparence ■ 02/06/2004
Agrément aux collectivités ■ 13/08/2004
Liste en sus ■ 04/11/2005

SMR important

ASMR III (modérée) par rapport à Aracytine® en termes d'efficacité et de maniabilité assurant une meilleure prise en charge du patient. Par son schéma d'administration d'une injection toutes les deux semaines notamment en phase d'induction comparé à celui de 2 administrations hebdomadaires de la forme standard de cytarabine, Depocyte® offre une meilleure maniabilité dans des situations généralement palliatives.

Pertinence scientifique :

Etude multicentrique, ouverte, contrôlée évaluant le Depocyte (n=18) vs la cytarabine non encapsulée (n=17) chez des patients atteints de méningite lymphomateuse. Des réponses ont été observées chez 13 (72%) des patients traités par Depocyte et 3 (18%) des patients sous cytarabine non encapsulée (p=0,002). Aucune différence significative n'a été observée au niveau des critères secondaires (durée de la réponse, survie sans progression, signes neurologiques, statut de performance, qualité de vie, survie globale).