

Après l'aide à la prise des médicaments, une étape importante de « **SURVEILLANCE** » de l'utilisateur doit être réalisée. Celle-ci consiste à **REPÉRER** et **SIGNALER** toute **situation inhabituelle** pouvant survenir suite à la prise des médicaments.

Qu'entend on par situation inhabituelle ?!

Tout événement, tout symptôme ou réaction inhabituel(le) en **TYPE** et/ou en **FRÉQUENCE** et/ou en **INTENSITÉ**



CONSTATER DES RESTES DE MÉDICAMENTS

Par exemple :

- dans les piluliers ou autres contenants
- par terre ou dans des lieux inappropriés
- médicament recraché par l'utilisateur



CONSTATER UN SYMPTÔME / RÉACTION INHABITUEL(LE)

Par exemple :

- somnolence, fatigue
- agitation, agressivité
- confusion
- chutes
- nausées, vomissements, diarrhées, constipation
- démangeaison
- difficulté à respirer

R
É
P
É
R
E
R

En cas de situation inhabituelle **repérée**, **ALERTER** le médecin ou l'encadrement et **TRACER/ÉCRIRE** l'information dans le dossier de l'utilisateur sont **2 étapes essentielles**.



ALERTER

QUI ? SYSTEMATIQUEMENT l'équipe médicale et soignante.

POURQUOI ? Pour l'informer de la situation et connaître la conduite à tenir.

EN CAS D'URGENCE VITALE ? Faites le 15



TRACER / ÉCRIRE

OÙ ? Dans le dossier de l'utilisateur (ou dossier de liaison).

COMMENT ? Par « écrit » sur un support adapté (papier ou informatisé). Les transmissions orales ne suffisent pas.

QUOI ? la situation constatée (description de la situation des circonstances, de l'horaire...), les actions réalisées (appel au professionnel, décision prise...). Toutes informations jugées pertinentes.

QUI ? Le professionnel ayant repéré et signalé le risque.

S
I
G
N
A
L
E
R

Détecter et gérer ces situations au plus tôt permet de limiter les conséquences éventuelles sur l'utilisateur.