

10/2018 : ANSM/ATUn

06/2019 : HAS/Recommandation de bonne pratique relative à l'antibiothérapie des infections à entérobactéries et à Pseudomonas aeruginosa chez l'adulte : place des carbapénèmes et de leurs alternatives.

03/2020 : ANSM/Octroi ATUc dans le traitement des infections dues aux bactéries aérobies à Gram négatif chez des patients adultes en absence d'alternative thérapeutique » (début 31/03/2020).

04/2020 : EMA/AMM européenne dans le traitement des infections dues à des bactéries aérobies à Gram négatif chez des patients adultes pour qui les options thérapeutiques sont limitées (23/04/2020).

12/2020 : ANSM/Fin ATUc le 19/12/2020

01/2021 : HAS/Avis CT du 20/01/2021

- **SMR important, ASMR IV uniquement en dernier recours pour le traitement des patients atteints d'infections à bactéries à Gram négatif multirésistantes** (notamment en cas d'entérobactéries et Pseudomonas aeruginosa, avec un mécanisme de résistance de type KPC, oxacillinase ou métallo- β -lactamases [NDM, VIM, IMP]) **et lorsque le recours aux autres options disponibles n'est pas envisageable.**
- **SMR insuffisant dans les autres situations, dont les infections à *Acinetobacter baumannii* ou *Stenotrophomonas maltophilia***
- **Recommandation : décision d'instauration du traitement par Fetcroja® (céfidérol) devra être prise après proposition documentée issue d'une réunion de concertation thérapeutique avec un référent antibiotique, avec réévaluation systématique 48h après le début du traitement.**

07/2021 : JO/Agrément aux collectivités, inscription sur la liste en sus, prix (JO 20/07/2021) de Fetcroja® uniquement dans l'indication « en dernier recours pour le traitement des patients atteints d'infections à bactéries à Gram négatif multirésistantes (notamment en cas d'entérobactéries et Pseudomonas aeruginosa, avec un mécanisme de résistance de type KPC, oxacillinase ou métallo- β -lactamases [NDM, VIM, IMP]) et lorsque le recours aux autres options disponibles n'est pas envisageable » (restriction par rapport à l'AMM européenne).

03/2022 : EMA/MAJ EPAR relative à l'interaction médicamenteuse **Céfidérol / Contraceptifs hormonaux à usage systémique :**

- **risque de diminution de l'effet des contraceptifs**
- **recommandation : utiliser en complément une autre méthode contraceptive pendant la durée du traitement par le Céfidérol et jusqu'à 28 jours après l'arrêt du Céfidérol.**